Blutoxol

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом для использования на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания (концентрат)



Свойства

Быстродействующее щелочное моюще-дезинфицирующее средство предназначено для чистки помещений по производству и переработке пищевых продуктов. Удаляет жировые и белковые загрязнения как растительного, так и животного происхождения, а также дезинфицирует очищенные поверхности.
Обладает обширным действием против бактерий рода сальмонеллы и листерии. Blutoxol рекомендован немецким ветеринарно-медицинским обществом (DVG) для применения при температурах 20°C и 10°C, что позволяет чистить им также и холодильные камеры. Не содержит ароматизаторов.
Соответствует требованиям Европейских Норм: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650 и EN 13697.
Имеется свидетельсто разрешающее применение средства в областях по производству и переработке пищевых продуктов.

Области применения

Применяется для чистки и дезинфекции водо- и щелочестойких полов, стен и рабочих поверхностей, а также кухонных машин и приборов (напр. мороженицы, машин для нарезки гастрономических продуктов), на предприятиях пищевой (молочной, мясной, кондитерской, консервной, пивоваренной и.т.д.) промышленности и общественного питания (ресторанах, кафе, барах и столовых - в пансионатах, школах, детских садах и т.д.). Не применять для чистки поверхностей восприимчивых к воздействию щёлочи.

Применение

Перед применением рекомендуется проверить в незаметном месте устойчивость материала к средству.

1 доза (содержимое дозирующей головки) = 25 мл



Повседневная уборка (дезинфицирующая) / Пенная чистка:
Приготовление рабочего раствора.
а) Наполните 500 мл флакон-распылитель холодной водой до метки и влейте 1 дозу концентрированного средства из оригинал-бутылки или с помощью дозирующего устройства DosiExpress.
б) Наполните 500 мл флакон-распылитель с помощью подходящего для этого Kiehl-дозирующего устройства например, DosiStation, DosiJet. Дозирование: см. таблицу.
в) Средство в 2-х л и 5-ти л расфасовке подсоедините к подходящим для этого Kiehl-дозирующим устройствам например, Arcantec, DosiJet. Дозирование: см. таблицу.

Дезинфицирующая чистка поверхностей (пенная):
Увлажните салфетку (лучше микроволоконную) пеной и протрите поверхности.
Грязную салфетку выполоскайте в воде.
Поверхности и оборудование непосредственно контактирующие с продуктами, ополосните после дезинфекцирующей уборки несколько раз горячей питьевой водой (40– 60 °C, 8-16 л на 1 м²).

Глубокая чистка (механическая дезинфицирующая очистка щёткой):
Механическая обработка однодисковой машиной и водопылесосом.
Расход: 400 мл на 8 л холодной воды.
Удаляя белковые и жировые отложения нанесите сначала чистящий раствор (в холодном виде) на пол, а затем добавляя горячую воду в бачок машины, обработайте пол механическим способом.

25.02.2013 17.06.2014

Расход на 1 кв. м.

Уборка дезинфицирующая, расход в зависимости от концентрации: 0,5-3,75 мл
Уборка дезинфицирующая, механическим способом : 16 мл
Пенная дезинфицирующая чистка: 0,3-1 мл

Только для профессионального использования!



Упаковка

6 бутылок x 1 л в коробке	Арт. № j 55 03 02
3 бутылки x 2 л в коробке	Арт. № j 55 03 08
Канистра 10 л	Арт. № j 55 03 10
Бочка 200 л	Арт. № j 55 03 72
6 пустых флаконов-распылителей x 500 мл в коробке	Арт. № z 01 23 73

www.kiehl-group.com

Blutoxol

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом для использования на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания (концентрат)



Концентрация в объёмных процентах (V-%) и в метрической системе в расчёте на продолжительность воздействия 30 и 60 мин.							
Области слабых загрязнений				Области сильных загрязнений			
Бактерицидное воздействие		Фунгицидное / Кандидомикозное		bakterizid		fungizid / levurozid	
30 минут	60 минут	30 минут	60 минут	30 минут	60 минут	30 минут	60 минут
Пищевые продукты животного происхождения (кроме молока) и предприятия общественного питания							
3,0 V-% (30 мл на 1 л воды)	2,5 V-% (25 мл на 1 л воды)	1,5 V-% (15 мл на 1 л воды)	0,5 V-% (5 мл на 1 л воды)	4,5 V-% (45 мл на 1 л воды)	3,5 V-% (35 мл на 1 л воды)	1,5 V-% (15 мл на 1 л воды)	1,5 V-% (15 мл на 1 л воды)
Молоко и молочные продукты							
3,0 V-% (30 мл на 1 л воды)	2,5 V-% 25 мл на 1 л воды)	1,5 V-% (15 мл на 1 л воды)	0,5 V-% (5 мл на 1 л воды)	3,0 V-% (30 мл на 1 л воды)	2,5 V-% (20 мл на 1 л воды)	1,5 V-% (15 мл на 1 л воды)	1,5 V-% (15 мл на 1 л воды)

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.

Критерии тестирования	Концентрация	Время воздействия	Эффективность
Европейская норма: EN 1040 (бактерецидное)	1 % (100 мл на 10 л воды)	5 минут	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
Европейская норма: EN 1275 (фунгицидное)	1 % (100 мл на 10 л воды)	5 минут	Candida albicans
Европейская норма: EN 1276 (бактерицидное)	2 % (200 мл на 10 л воды)	5 минут	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в т. ч и MRSA, Escherichia coli, Enterococcus hirae
Европейская норма: EN 1650 (фунгицидное), слабозагрязненные поверхности и сильнозагрязненные поверхности	0,5% (50 мл на 10 л воды) 1 % (100 мл на 10 л воды) 3 % (300 мл на 10 л воды) 2 % (200 мл на 10 л воды)	15 минут 5 минут 5 минут 15 минут	Candida albicans
Европейская норма: EN 13697 (бактерицидное), слабозагрязненные поверхности и сильнозагрязненные поверхности	7,5 % (750 мл на 10 л воды) 5 % (500 мл на 10 л воды)	5 минут 30 минут	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в т.ч. и MRSA, Escherichia coli, Enterococcus hirae
Европейская норма: EN 13697 (бактерицидное), слабозагрязненные поверхности и сильнозагрязненные поверхности	7,5 % (750 л на 10 л воды) 5 % (500 мл на 10 л воды)	5 минут 30 минут	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
Европейская норма: EN 13697 (фунгицидное), слабозагрязненные поверхности и сильнозагрязненные поверхности	3 % (300 мл на 10 л воды) 2 % (200 мл на 10 л воды) 4 % (400 мл на 10 л воды) 3 % (300 мл на 10 л воды)	15 минут 30 минут 15 минут 30 минут	Candida albicans

См. веб-сайт: www.iho-desinfektionsmittelliste.de. Зарегистрирован в реестре «Немецкого ветеринарно-медицинского общества», при +20°C и +10°C/(DVG-gelistet).

Состав
В 100 г средства содержатся 2,4 г Didecyldimethylammoniumchlorid,
1,9 г Alkyl-benzyl-dimethylammoniumchlorid соединений.
Другие составные элементы (в соответствии с 648/2004/EC): неионогенные ПАВ < 5%, органические и неорганические соли, красящие вещества.
Показатель pH (в концентрате): ок.13 Показатель pH (в растворе): ок.12,5

Xi, Раздражающий в концентрате; N, Опасно для окружающей среды в концентрате
R 38 Раздражает кожу. R 41 Опасность серьёзного повреждения глаз. R 50 Очень ядовито по отношению к водным организмам. S 26 В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и обратиться к врачу. S 61 Избегать выпуска в окружающую среду. Сослаться на специальные инструкции /Листы данных по безопасности. S 24/25 Избегать контакта с кожей и глазами. S 37/39 Работать в защитных перчатках, очках/маске.

Средства с дезинфицирующими свойствами используйте по назначению. Перед применением внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке и в нформационном листе.

www.kiehl-group.com